

ИНТРОДУКЦИЯ БОБРА В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ

Волох А.М. Таврический государственный агротехнологический университет, Мелитополь, Украина

volokh50@ukr.net

Восстановлению ареала бобра в Украине во многом способствовали работы по его расселению, которые на севере начались ещё в 30-е, а на юге - в 60-е годы XX ст.

В Кировоградской области (оз. Берестуватка), в 1964 г. выпустили 7 зверей, отловленных в зоне затопления Киевской ГЭС. В 1976 г. здесь насчитывалось 13 бобров. Из-за невозможности отселения, здесь наблюдался очень низкий прирост численности, который за 12 лет составил 5.2% в год. В 90-е годы все звери здесь были уничтожены.

В Черкасской области, где бобры обитали ещё с 50-х годов, в 1975 г. был произведён выпуск 14 особей в оз. Ирдынь, которое избилует торфяными карьерами, что привело к формированию мощного очага.

В Полтавской области в 1966 г. было учтено 6 бобров, а в 1969 г. - 24, которые проникли сюда из Черкасской по Днепру. После сверхвысокого половодья 1970 г. многие из них покинули прежние места обитания и поэтому считались погибшими. Новый отсчёт поголовья начался с 1972 г., после переселения в угодья Диканьского ГОХ (рр. Ворскла, Добре-шин, Мерла) 17 бобров из зоны затопления Каневской ГЭС. В 1975/76 гг. здесь было выпущено ещё 19 зверей, отловленных на Черкащине. Работы по расселению бобра в Полтавской области оказались весьма успешными, поскольку в 2000 г. на её территории было учтено 972 зверей. Более того, ещё в 70-х годах бобры отсюда проникли на территорию Харьковской и Сумской областей, где позже возникло много поселений.

В Днепропетровской области в 1972 г. был произведён выпуск 6 бобров в старицу р. Орели, которых привезли из Полтавской области. Позже звери сформировали небольшой очаг из нескольких колоний, расположенных на Днепродзержинском водохранилище в Верхнеднепровском и Петриковском р-нах (данные Н.В. Антоненц).

В Херсонской области (Цюрупинский р-н) в 1965 г. на рукаве Днепра (р. Басанка) было интродуцировано 19 бобров из Киевской области. В дальнейшем звери широко расселились по днепровской пойме, где в 1979 г. было учтено более 60 особей. Отдельные бобры в 1984 г. проникали даже в Каховское водохранилище. В 1981 г. появление этих зверей было зафиксировано в Черноморском заповеднике (данные З.В. Селюниной). К настоящему времени ареал бобра в низовье Днепра охватывает территорию от Новой Каховки до устья, а численность его в Херсонской области превышает 120 особей.

В Николаевской области в 1973 г. выпустили 5 бобров на р. Кодыме в ГОХ «Катерин -ка». Выпуск прошёл удачно, поскольку к 2002 г. звери освоили многие угодья и проникли в Южный Буг. В 2006 г. на территории охотничьего хозяйства "Бакшала" было обнаружено 3 небольших бобровых поселения.

После выпуска в 1971 г. бобров (n=20) в Луганской области (Кременской р-н) они расселились по притоках Северского Донца, а в 1989 г. появились на р. Айдаре, в 1992 г. - на р. Евсуге в Беловодском р-не, а в 1995 г. - на р. Деркуле в Марковском р-не. В 80-е годы бобры из кременского очага проникли в Донецкую область и заселили большую территорию.

Таким образом, в Украине, благодаря строгой охране уцелевших поселений, а также интродукции более 600 зверей, за короткий срок удалось почти полностью восстановить ареал вида, который сейчас занимает половину территории страны.